

STOOL COLLECTION

P A T I E N T I N S T R U C T I O N S

Giardia antigen
H. pylori antigen
Rotavirus antigen



Obtenga un recipiente para muestras fecales en el laboratorio.

El recipiente debe ser un frasco limpio y estéril con una tapa hermética.

Instrucciones para tomar la muestra:

1. Evite usar antiácidos, bario, bismuto y medicamentos antibióticos, anti-amibianos y anti-diarreicos o laxantes oleosos antes de tomar la muestra.
2. Evite contaminar la muestra de heces con orina o con agua durante su recolección.
3. No son aceptables las muestras tomadas de pañales. Para tomar una muestra de un niño(a) que use pañales, cubra el pañal con una envoltura de plástico, tome la muestra del plástico con que cubrió el pañal y transfiera la muestra al recipiente.
4. Tome la muestra usando una bandeja limpia para muestras, una bolsa de plástico o coloque una película de plástico transparente sobre el asiento del inodoro.
5. Con un abatelenguas, transfiera 15 gramos de materia fecal al frasco para muestras y selle la tapa.
6. Adhiera una etiqueta al recipiente (no a la tapa) con el nombre del paciente, fecha de nacimiento y la fecha y hora en que tomó la muestra.
7. **CONGELE la muestra inmediatamente después de tomarla.**
8. **Lleve el recipiente con la muestra al laboratorio SOBRE HIELO, dentro de las 48 HORAS siguientes a su recolección.**